

ИПУТЬ

Авторы: Волчек А. А., Городнюк Ю. П., Сидак С. В.

Ипутъ

Река в Климовичском районе Могилёвской области, Добрушском и Гомельском районах Гомельской области Беларуси; Смоленской и Брянской области России. Длина реки 437 км, в пределах Беларуси 110,33 км.

Левый приток реки **Сож**. Основные притоки в Беларуси: **Нетёша**, **Хоропутъ** (левые), **Очёса** (правый).

Начинается в 1,5 км к юго-востоку от деревни Пожарь Климовичского района, течёт по территории Смоленской, Брянской и Гомельской областей, впадает в Сож на северо-восточной окраине города Гомель. Верховье реки на Оршанско-Могилёвской равнине, приустьевой участок на территории Гомельского Полесья.

Площадь водосбора 10 900 км². Среднегодовой расход воды у города Добруш (31 км от устья) 43,7 м³/с (максимальный — 179, минимальный летний 14,3, минимальный зимний — 26,6). Общее падение реки 84,9 м. Средний уклон водной поверхности 0,2‰.

Долина трапецеидальная, ширина в верховье 1–1,5 км, ниже — 2,5–3,5 км, на участке от города Сураж Брянской области до устья 4–8 км.

Склоны пологие, реже крутые, высота 10–30 м.

Пойма преимущественно двухсторонняя, местами чередуется по берегам, в низовье пересечена старыми руслами и старицами, ширина 1,5–2 км.

Русло извилистое (ширина в верховье 1,5–12 м, на остальном протяжении 20–50 м), канализировано в 1960 г., 1978 г. и 1981 г. на протяжении 24,3 км от **истока** до границы с Россией.

Берега высотой 0,5–2 м, крутые и обрывистые.

Весеннее **половодье** продолжается с середины марта до начала мая. На период весеннего половодья приходится около 48 %, на летне-осеннюю **межень** — 30 %, зимнюю — 22 % объёма годового стока. Максимальный уровень половодья в апреле. Средний уровень над самой низкой меженью 3–4 м. Средняя высота над меженным уровнем от 1,8 м в верховье до 2,4 м в нижнем течении. На период весеннего половодья приходится 50 %, летне-осеннюю межень — 30, зимнюю — 20 % объёма годового стока.

Замерзает в 1-й половине декабря, **вскрытие** реки в конце марта — начале апреля.

Весенний ледоход 4–6 суток.

Режим реки изучается с 1925 г. (в Беларуси с 1930), наблюдения ведутся на гидрологическом посту города Добруш (с 1991). В 0,5 км выше Добруша и в 1,7 км ниже Добруша расположены пункты наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим и гидробиологическим показателям.

В реке водятся щука, густера, укляя, карась серебряный, пескарь, елец, плотва, голавль, краснопёрка, линь, ёрш, окунь.

Используется как водоприёмник мелиоративных систем. На реке возле деревни Тимошки Климовичского района плотина и [пруд](#), у Добруша — плотина; зоны отдыха местного значения.