

КИПАРИСОВИК

Авторы: Джус М. А.

Кипарисовик (*Chamaecyparis* Spach), род голосеменных хвойных растений семейства [Кипарисовые](#).

Другое название: лжекипарис.

Насчитывает 5–6 видов, распространённых преимущественно в умеренных и субтропических широтах прибрежных регионов Северной Америки (США) и Восточной Азии (Япония, Китай). Широко культивируются в различных регионах земного шара. Ранее долгое время к роду кипарисовик относили также каллитропсис нутканский [*Callitropsis nootkatensis* (D. Don) Oerst.].

В Беларуси дикорастущих представителей рода нет. Интродуцировано 4 вида: кипарисовик Лавсона [*Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl.], кипарисовик туполистный, или японский [*Chamaecyparis obtusa* (Siebold et Zucc.) Endl.], кипарисовик горохоплодный [*Chamaecyparis pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl.] и кипарисовик туевидный [*Chamaecyparis thyoides* (L.) Britton, Sterns et Poggenb.]. Наиболее распространены в культуре кипарисовик Лавсона и кипарисовик горохоплодный, имеющие большое количество сортов (более 700), которые отличаются размерами растений, формой кроны, окраской листьев.

Вечнозелёные однодомные кустарники или деревья высотой до 70 м и диаметром ствола до 3,5 м. Продолжительность жизни до 600 и более лет. Корневая система хорошо развита. Крона конусовидная или пирамидальная, обычно с поникающей верхушкой. Побеги удлинённые, чаще уплощённые. Листья накрест супротивные, простые, цельные, цельнокрайные, до 4 мм длиной, взрослые листья чешуевидные, ювенильные — часто игловидные. Пыление в [апреле](#) — [мае](#). Мужские шишки мелкие, продолговатые, длиной 2–4 мм, красноватые или желтоватые. Зрелые женские шишки округлые, до 12 мм в диаметре, с 4–5 (6) парами щитовидных супротивных чешуй, сперва зелёные, при созревании бурые или фиолетовые, созревают [осенью](#) в год опыления. После созревания опадают целиком. Семена уплощённые, с двумя крыльями.

Теневынослив, влаголюбив, требователен к плодородию почвы, плохо переносит засуху, умеренно зимостоек, среднеустойчив к городским условиям, устойчив к вредителям и болезням, хорошо переносит стрижку, легко размножается черенкованием.

Древесина лёгкая, жёлтая или светло-коричневая, ароматная, устойчива к гниению, широко применяется в строительстве, отделке зданий, судостроении, для изготовления мебели и различных поделок. Ценное декоративное растение. Используется

в народной медицине, парфюмерии, лесоразведении.

Литература

1. Флора Беларуси. Сосудистые растения: в 6 т. Т. 1 / под общ. ред. В. И. Парфенова. – Минск: Беларуская наука, 2009.
2. Энцыклапедыя прыроды Беларусі: у 5 т. Т. 3: Катэнарыя—Недайка / Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1984.
3. Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. Т. 8: Канто—Кулі / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1999.